

## Resultados clínicos conforme achados operatórios na colecistectomia laparoscópica

Clinical outcomes according to operative findings in laparoscopic cholecystectomy

Resultados clínicos según hallazgos operatorios en colecistectomía laparoscópica

Tarso Buaiz Pereira Martins<sup>1</sup>, Auriane de Sousa Alencar<sup>2</sup>, Camila Botelho Campelo Leite<sup>1</sup>, Julciele Cicera da Silva<sup>1</sup>, Virgínia Portela Cardoso<sup>1</sup>, Carlos Alberto Rosado da Silva Filho<sup>3</sup>, Luis Gustavo Cavalcante Reinaldo<sup>1</sup>.

---

### ARQUIVO SUPLEMENTAR

#### APÊNDICE - Instrumento de coleta de dados

Número do formulário: \_\_\_\_\_

Data da cirurgia: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

#### Variáveis demográficas

Idade (em anos completos): \_\_\_\_\_

#### Sexo:

- Masculino  
 Feminino

#### Estado civil:

- Com companheiro  
 Sem companheiro

#### Escolaridade:

- Até 8 anos  
 Acima de 8 anos

#### Cor/raça autodeclarada:

- Parda  
 Branca  
 Preta  
 Amarela  
 Indígena

---

<sup>1</sup> Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), Teresina - PI.

<sup>2</sup> Hospital Infantil Lucídio Portella, Teresina - PI.

<sup>3</sup> Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro - RJ.

### VARIÁVEIS CLÍNICO-CIRÚRGICAS

Peso (em kg): \_\_\_\_\_

Uso de dreno intra-abdominal:

Sim

Não

Altura (em m): \_\_\_\_\_

Indicação da cirurgia:

Tratamento de colecistite aguda

Tratamento de colecistite crônica

Colelitíase sintomática

Discinesia biliar

Colecistite acalculosa

Pancreatite biliar

Pólipos ou massas em vesícula biliar

Outra: \_\_\_\_\_

Uso de dreno de Kehr:

Sim

Não

Uso de colangiografia intraoperatória:

Sim

Não

Tempo de cirurgia: \_\_\_\_\_ minutos

Conversão para cirurgia aberta:

Sim

Não

### ACHADOS CIRÚRGICOS

Quadro 1 - Sistema de pontuação cirúrgica da vesícula biliar.

<b>Aparência da vesícula biliar (circular apenas uma opção)</b>	
Adesões cobrindo <50% da vesícula biliar	1
Adesões >50% da vesícula biliar, mas sem cobrir (enterrar)	2
Adesões cobrindo (enterrando) a vesícula biliar	3 (máx)
<b>Distensão/Contratura (circular todos os presentes)</b>	
Vesícula biliar distendida (ou enrugada contraída)	1
Incapaz de agarrar com pinça laparoscópica atraumática	1
Pedra >1 cm impactada na bolsa de Hartman	1
<b>Acesso (circular todos os presentes)</b>	
IMC>30 kg/m <sup>2</sup>	1
Aderências de cirurgia anterior limitando o acesso	1
<b>Sepse grave/complicações (circular todos os presentes)</b>	
Bile ou pus livre fora da vesícula biliar	1
Fístula	1
Total	_____
Grau de dificuldade (classificação)	
<input type="checkbox"/> Fácil	<2
<input type="checkbox"/> Moderado	2-4
<input type="checkbox"/> Muito difícil	5-7
<input type="checkbox"/> Extremo	8-10

### VARIÁVEIS DE RESULTADOS

**Dor no 1º dia pós-operatório:**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Náuseas e vômitos:**

- Sim
- Não

**Sangramento:**

- Sim
- Não

**Infecção:**

- Sim
- Não

**Danos a estruturas adjacentes:**

- Sim
- Não

**Tempo de internação:** \_\_\_\_\_ dias

- Alta no dia seguinte (12-24 h)
- Maior que 24 h

**Icterícia, colúria ou acolia fecal:**

- Sim
- Não

**Febre:**

- Sim
- Não

**Óbito:**

- Sim
- Não

**Fonte:** Martins TBP, et al., 2022. Sistema de pontuação baseado em Sugrue M, et al., 2019.